In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

LA FACULTÉ .Net

SEEK KNOWLEDGE

Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucratif use.
Some articles are subject to the author's copyrights.
Our team does not own copyrights for some content we publish.
"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all the authors.
If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com
All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.
Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.

Bras :

Loge antérieure →nerf musculo-cutané

Loge postérieure →nerf radial

Avant bras :

-loge antérieure →nerf médian et cubital

-loge postérieur → nerf radial

-loge latérale → nerf radial

Main :

L'éminence thénar (pouce) → nerf médian+++, cubital

L'éminence hypothénar (petit doigt) →nerf cubital

Jambe :

Loge antérieure : jambier antérieur, péronier antérieur, extenseur du gros orteil, extenseur commun des orteils.

Estomac :

Vascularisation : tronc cœliaque

-cercle artériel de la petite courbure : artère pylorique, artère coronaire stomachique

-cercle artériel de la grande courbure : artère gastro-épiploique droite (gastroduodénale) et gauche (artère splénique)

Bloc duodéno-pancréatique

position rétro péritonéale +++

le cholédoque se jette dans la grande caroncule

Pancréas :

-artère pancréatico-duodénale droite supérieure et inférieure : provient de l'artère gastroduodénale, artère hépatique, tronc cœliaque

-artère pancréatico-duodénale gauche : provient de l'artère mésentérique supérieure

moyens de fixité : petit épiploon, grand épiploon, épiploon gastro-splénique ; ligament gastro-phrénique

Colon

Colon transverse fixé à la paroi par le méso colon transverse

Arcade de Riolan : anastomose entre l'artère mésentérique supérieure (colon droit) et inférieure (colon gauche) → artères rectales supérieures

Le péritoine tapisse en partie la face antérieure du rectum

Artère rectale moyenne provient de l'artère hypogastrique

Veine rectale supérieure se jette dans la VMI

Organisation du péritoine :

Méso : repli péritonéal qui relie à la paroi un segment du tube digestif : méso colon transverse, mésentère, méso sigmoïde

Epiploon : repli péritonéal qui relie deux organes intra abdominaux entre eux

-épiploon gastro-hépatique (petit épiploon), gastro-splénique, pancréatico-splénique

Arrière cavité des épiploons : 2 parties

-vestibule : en arrière du petit épiploon
-arrière cavité proprement dite : en arrière de l’estomac
Les deux communiquent par le FORAMEN BOURSAE AMENTALIS
L’arrière cavité des épiploons communique avec la cavité péritonéale par l’orifice de Winslow limité en arrière par la VCI

OS de la face :
pairs : maxillaire, palatin, unguis (os lacrymal),malaire
Impair : vomer, mandibule,
Nerfs crâniens :
Fente sphénoïdale : III IV V1 VI
Grand rond V2
Trou ovale V3
Petit rond V3
Trou déchiré postérieur : IX, X, XI
Trou condylien antérieur : XII
Trou auditif interne: VII, VII bis, VIII

fosses nasales :
paroi interne : lame perpendiculaire de l’éthmoïde, vomer , cartilage de la cloison
les sinus maxillaires et frontaux s’ouvrent dans le méat moyen

tronc VP en arrière de l’isthme du pancréas
veine cave :
traverse le diaphragme D9, œsophage D10
-l’aorte thoracique se termine à hauteur de D4
-l’aorte abdominale se termine à hauteur de L4